

Gerbilles de Mongolie *Meriones unguiculatus*

Gerbil, souvent appelé souris du désert



SHUTTERSTOCK

Informations générales

Origine : steppes d'Asie, autres espèces également en Afrique

Espérance de vie : 3 - 4 ans

Maturité sexuelle : à l'âge de 10 à 12 semaines

Période d'activité : les gerbilles sont actives au crépuscule. Lorsqu'elles détenues comme animaux de compagnie, elles sont aussi régulièrement actives en journée.

Mode de vie naturel

Les gerbilles vivent en grandes familles avec plusieurs générations de jeunes. Au sein du groupe, les gerbilles vivent généralement paix. Le territoire est massivement défendu contre les animaux étrangers. Les gerbilles habitent d'immenses systèmes de galeries et de grottes qu'elles creusent elles-mêmes et dans lesquelles elles élèvent leurs petits, stockent leurs provisions et se réchauffent mutuellement en hiver. Dans leur région d'origine, les steppes mongoles, la température peut jusqu'à -50 °C en hiver.

Comportement

Structure du groupe : dans les familles de gerbilles, seul le couple parental se . Les jeunes restent avec leur famille bien au-delà de la maturité sexuelle, mais ne se pas. Ils participent à l'élevage des jeunes frères et sœurs, à la défense du territoire commun, à la collecte de nourriture et à la construction du système de construction souterraine commun. La structure de groupe des gerbilles ressemble donc beaucoup à celle des loups.



Famille de gerbilles dans leur système de construction, qu'elles ont creusé elles-mêmes dans du sable humide : La mère (à droite), le jeune plus âgé de la dernière portée (à gauche) et les jeunes de la dernière portée (en bas), les yeux encore fermés.



Le père (derrière) et le fils. Dans ce groupe, des disputes ont éclaté entre les fils après le décès du père en raison de son âge.

Les chercheurs ont constaté que l'expérience ainsi acquise dans l'élevage de jeunes frères et sœurs conduit plus tard à un plus grand succès dans l'élevage de ses propres petits, que ce soit un mâle ou une femelle qui apporte plus d'expérience. En outre, dans la nature, semble extrêmement difficile pour les jeunes souris migrantes d'établir elles-mêmes un territoire, de creuser un terrier et de fonder une famille. La meilleure stratégie consiste donc à rester à la maison et à attendre de voir si, plus tard, elles pourront prendre le "poste de chef" et se reproduire. Pour le risque de consanguinité, la femelle reproductrice de chaque famille va activement à l'étranger, recherche des mâles de familles voisines et récupère ainsi des gènes frais pour sa descendance. C'est ce qui a été observé dans la nature.

Agression soudaine : chez les gerbilles, l'agressivité soudaine, qui peut éclater d'un jour à l'autre entre des membres de la famille jusque-là pacifiques, pose problème. La plupart des demandes de conseil concernant les gerbilles auprès de la Protection Suisse des Animaux PSA sont dues à une agressivité soudaine. Ce n'est pas pour rien que les gerbilles portent le nom scientifique de *Meriones unguiculatus*, petit combattant grimaçant. Lorsque les gerbilles se battent entre elles, c'est une question de vie ou de mort, surtout dans un terrarium fermé où l'animal vaincu ne peut pas s'enfuir. Les animaux qui se battent se poursuivent en permanence, les morsures typiques des courses-poursuites sont sur la queue et la racine de la queue. Lorsque l'animal poursuivi se rend, les adversaires se tapent dessus avec leurs pattes avant et se mordent mutuellement, formant ainsi une boule de combat. Les blessures de combat typiques sont des morsures aux épaules, à la nuque et au cou. La première mesure à prendre est donc de séparer immédiatement les animaux qui se disputent (attention : il faut impérativement des gants en cuir épais, les gerbilles qui se battent mordent tout ce qui passe à proximité) et de les garder séparément. Il ne suffit pas d'installer une grille dans le terrarium, elles peuvent encore se mordre le nez et les pattes à travers la grille. On ne peut pas garder ensemble des animaux qui se sont déjà battus ! Si le groupe est suffisamment grand, on peut former deux nouveaux groupes. Il est préférable que les nouveaux groupes présentent des différences de poids aussi importantes que possible.

Des chercheurs de l'université de Halle en Allemagne ont découvert que de telles périodes d'agressivité se produisent régulièrement chez les gerbilles dans des groupes familiaux qui se sont développés naturellement, environ tous les 3/4 ans. Dans ce cas, l'agression souvent de la femelle adulte ou de la mère, et

1 ou 2 animaux sont chassés du groupe. La raison en est la concurrence pour la reproduction et les querelles de rang. Personne n'a encore étudié la raison de cette agression soudaine dans les groupes de même sexe, mais on peut supposer qu'il s'agit ici aussi de querelles de rang. La seule façon de prévenir ce phénomène est de créer des groupes d'âge et de poids différents (p. ex. père et fils) afin d'établir une hiérarchie claire entre les animaux (en règle générale, plus le poids est élevé, plus le rang est important). Comme l'agressivité rarement le fait des mâles, **les groupes composés uniquement de mâles sont généralement plus pacifiques que les groupes de femelles** - contrairement à d'autres rongeurs, où les groupes de mâles ne pas recommandés ! Les chercheurs de Halle ont certes découvert que les animaux qui vont attaquer, ceux qui se comportent de manière neutre et peuvent rester dans la famille et ceux qui sont chassés se distinguent par leur profil hormonal. Dans la pratique, il n'y a généralement pas de signes avant-coureurs de l'apparition d'une agression soudaine. Une prudence accrue est toutefois mise si l'on procède à des changements dans la détention, exemple en ajoutant un deuxième terrarium qui pourrait être défendu, ou si l'un des animaux plus âgés et plus lourds (et donc de rang supérieur) tombe malade ou meurt.

Remarque : l'agressivité soudaine n'est pas un trouble du comportement, mais un comportement normal des gerbilles, qui peut rapidement être fatal dans des conditions de captivité, car l'animal inférieur ne peut pas s'enfuir. En liberté, les animaux attaqués s'éloigneraient (mais cela équivaut généralement aussi à une condamnation à mort).

Socialisation : selon l'ordonnance sur la protection des animaux, les animaux d'espèces sociales, comme les gerbilles, doivent avoir la possibilité d'avoir des contacts sociaux appropriés. **Concrètement, cela signifie que les gerbilles ne pas être détenues seules, mais en groupe.** Or, il régulièrement qu'il reste d'un groupe un animal isolé plus âgé. Que faire alors ? Les gerbilles adultes sont notoirement difficiles à réintégrer dans un groupe en raison de leur odeur de groupe et de leur caractère peu combatif à l'égard des étrangers au groupe. En général, il est recommandé de constituer de nouveaux groupes avec des animaux âgés de 5 à 8 semaines maximum, c'est-à-dire avant que la glande abdominale ne se développe et que les animaux ne commencent à montrer des comportements de marquage et de territorialité.

Différentes méthodes de socialisation sont recommandées : Echange de cages, méthode du petit espace, terrain neutre. Il n'existe pas d'études systématiques sur ce qui fonctionne le mieux, en outre, cela dépend aussi des animaux à socialiser et de leurs expériences sociales.

Lors de l'**échange de cages**, les animaux à associer sont placés ou échangés chaque jour pendant plusieurs semaines dans le terrarium de l'autre animal. L'idée est qu'ils puissent s'habituer à l'odeur de leur futur partenaire et l'adopter. Il peut toutefois y avoir des confrontations, même après des semaines, lorsqu'on les met ensuite ensemble. Il n'est pas recommandé de diviser un grand terrarium en deux avec une grille au milieu et d'échanger ensuite les animaux entre leurs moitiés. Des morsures sérieuses peuvent au niveau de la grille. Avec la **méthode du petit espace**, les animaux à associer sont placés dans une cage de transport si petite qu'ils ne peuvent pas se redresser. L'idée est qu'ils ne se battent pas entre eux s'ils ne peuvent pas se redresser. Du point de vue du bien-être animal, cette méthode est **très problématique**, car les animaux sont soumis à un stress massif, inévitable et totalement contre nature. La méthode du **terrain neutre** consiste à les rassembler tous sur une grande surface qui contient beaucoup de distractions, d'occupations et de nombreux abris, mais pas d'impasses. Ils y sont observés pendant plusieurs heures et il faut toujours être prêt à intervenir et à les séparer en cas de dispute. Dès qu'un animal s'intéresse un peu trop à un autre, il est distrait. Les signes positifs d'intégration sont les suivants : les petits/jeunes animaux piaillent haut ou poussent la tête sous le menton de l'animal plus grand, ou ce dernier tourne le dos et les nettoie (souvent de manière assez brusque). Le fait d'être ensemble "sur un

Le "repos en tas" est le meilleur signe que la cohabitation fonctionné. Les signes avant-coureurs sont toutefois

Claquement de dents, fouet avec la queue (indique une forte excitation), course-poursuite. faut alors essayer de distraire l'animal poursuivant, par exemple en lui tendant de la nourriture convoitée, en soufflant brièvement dessus, en l'aspergeant de quelques gouttes d'eau ou en versant 2 à 3 gouttes d'huile alimentaire sur son pelage - les animaux distraits s'occupent alors d'abord de manger ou de soigner leur pelage et ne se préoccupent plus de leur "adversaire". Une bonne stratégie de distraction consiste également à ne pas associer d'emblée un seul animal adulte à un jeune, mais à en ajouter 3 ou 4. Comme ils s'agitent dans tous les sens, l'animal adulte ne peut guère se concentrer sur l'un d'eux. Une situation typique est alors que les jeunes se retirent dans des tubes, que l'animal adulte passe la tête à l'intérieur et fouette la queue avec excitation, que les jeunes piaillent haut (geste de soumission, conduit généralement à une inhibition de l'attaque), que l'animal adulte se détourne et commence à ronger des branches ou du carton ou à pousser violemment la litière dans un coin avec sa tête (comportement de saut et d'évacuation de l'excitation). Il est parfois recommandé d'appliquer du shampoing sec pour animaux sur les animaux avant de les associer, afin de masquer leur propre odeur ; d'autres recommandations vont dans le même sens et préconisent de baigner les animaux dans du thé à la menthe refroidi. Comme les gerbilles ont un très bon nez et quelles risquent de prendre froid si elles sont mouillées, il est déconseillé de prendre de telles mesures, car elles n'ont que peu ou pas d'effet.

Comme il y a toujours un grand risque de morsure ou même de mort lors d'une tentative de cohabitation, faut procéder de manière pragmatique lors de la cohabitation de gerbilles adultes. Une nouvelle association avec des mâles adultes et plusieurs jeunes mâles de moins de 8 semaines, ou un mâle adulte avec une femelle adulte en œstrus (mais difficile à constater sans frottis et microscope), a le plus de chances de réussir, mais avec les conséquences désagréables d'une progéniture non désirée... Il est préférable d'essayer la cohabitation avec des animaux de refuge, que l'on peut rendre si nécessaire si cela ne fonctionne pas, plutôt qu'avec des animaux de l'animalerie (pas de possibilité de retour). Si cela échoue une fois, il faut pas réessayer, car lors de la prochaine tentative, l'animal concerné, qui déjà fait de mauvaises expériences et qui a peut-être même été mordu ou mordu lors de la première tentative, réagira encore plus rapidement de manière agressive. En outre, les tentatives de socialisation sont une source de stress énorme pour les animaux. S'il s'agit d'animaux de plus de 3 ans, les tentatives de socialisation ne sont plus appropriées en raison de leur âge avancé.

Groupes recommandés pour l'élevage d'animaux de compagnie : les groupes de même sexe, mâles ou femelles, entre 2 et 6 animaux (selon l'espace disponible) sont recommandés - bien qu'il faille s'attendre à une agressivité soudaine même dans les groupes de même sexe. Les couples ne conviennent pas, car il faut alors s'attendre à une descendance de 4 à 10 jeunes toutes les 4 à 5 semaines. Il n'est pas recommandé de castrer le mâle d'un couple mixte. Des chercheurs de l'université de Halle ont découvert qu'un tiers des mâles castrés issus de tels couples se retrouvent un jour soudainement et inexplicablement morts dans leur enclos. On suppose que la femelle soumet un mâle stérile à un tel stress qu'il en meurt.

Communication : les gerbilles communiquent par des marques odorantes. Elles déposent la sécrétion grasse de leur glande abdominale sur les objets de leur territoire, mais aussi sur leurs congénères, ce qui crée une odeur de groupe. Le comportement de marquage se reconnaît au fait que les gerbilles rampent sur l'objet à marquer en aplatissant leur ventre. La sécrétion des glandes abdominales a une odeur légèrement sucrée et âcre, presque agréable pour l'homme. Comme les gerbilles ne marquent pas avec leur urine, contrairement aux souris domestiques et aux rats, et qu'en tant qu'animaux du désert, elles n'émettent que peu d'urine très concentrée, les terrariums de gerbilles ne dégagent pas rapidement une odeur désagréable. La litière reste longtemps sèche. Les gerbilles communiquent aussi avec les ultra-



Le creusement stéréotypé, un trouble du comportement, se produit lorsque les jeunes gerbilles ne peuvent pas grandir dans le système de construction parental.

mais surtout en cas de conflit et lors de la reproduction. Les jeunes gerbilles, encore aveugles et nues, qui tombent du nid, appellent leur mère dans la zone des ultrasons.

Système de construction

Dans la nature, une gerbille sans système de construction est très vite une gerbille morte et dévorée, car différents prédateurs s'en prennent à elle : Renards corses, chats sauvages de Manul, rapaces, serpents. La famille et le système de construction commun sont absolument nécessaires à la survie. Il n'est donc pas étonnant que les gerbilles qui grandissent sans système de construction présentent le trouble du comportement suivant

développer un "creusement stéréotypé" - gratter dans les coins de la cage pendant plusieurs minutes, sans rien faire, ce qui prend jusqu'à un quart du temps actif. Ce trouble comportemental est dû au fait que les gerbilles sans terrier essaient de creuser un terrier dans une cage avec peu de litière, mais n'y parviennent pas - frustrées, elles continuent à creuser, mais aucun terrier n'est jamais construit, et elles restent donc coincées dans une sorte de boucle sans fin comportementale. Mais dès qu'on leur donne un terrier, même s'ils ne l'ont pas creusé eux-mêmes, le comportement de creusement revient à la normale. Ces résultats de recherche ont eu pour conséquence que la législation suisse sur la protection des animaux prescrit désormais litière profonde pour l'élevage des gerbilles, afin qu'elles puissent creuser un système de construction. L'ordonnance sur la protection des animaux prévoit une litière de 25 cm, mais les systèmes de construction sont plus stables et plus complexes avec une litière de 40 cm. L'utilisation de systèmes de construction artificiels au lieu d'une litière profonde est également autorisée pour les animaux de laboratoire, mais pas pour les animaux de compagnie. Il est préférable pour les animaux de pouvoir creuser eux-mêmes, d'une part parce que c'est une bonne occupation, d'autre part parce que le système de construction se modifie constamment. Les anciennes galeries et les anciens nids s'effondrent, de nouveaux sont creusés, les animaux changent d'emplacement de nid tous les 3 à 5 jours. En plein air, il s'agit d'une mesure adaptée pour éviter que trop de parasites ne s'accumulent dans le nid.

Attitude

Enclos : les gerbilles devraient être détenues dans des enclos spacieux avec une litière profonde, dans lesquels elles peuvent construire un système de construction. Les cages grillagées pour rongeurs, telles qu'elles proposées dans le commerce, sont trop petites et inadaptées à la détention des gerbilles, car elles ne peuvent pas être recouvertes d'une litière suffisamment profonde. Des terrariums ou des aquariums pour rongeurs, éventuellement grillagés, sont possibles. Des enclos à plusieurs étages comme la villa pour gerbilles (fournisseur de clapiers pour petits animaux, voir liens), dont la partie inférieure peut être recouverte d'une profonde litière, sont également adaptés. L'idéal serait un espace de vie de plusieurs mètres carrés de surface recouverte d'une litière d'au moins 40 cm d'épaisseur, de préférence de 70 à 80 cm d'épaisseur.

d' fossé. Du point de vue de la protection des animaux, le minimum serait un terrarium de 140 x 60 x 60 cm pour 2 à 4 animaux, mais un terrarium plus grand est toujours préférable. Il n'est pas prouvé que les terrariums plus grands sont plus susceptibles de provoquer une agressivité soudaine.

L'enclos doit être placé de manière à ce qu'une petite partie soit légèrement ensoleillée pendant quelques heures par jour, car les gerbilles aiment se coucher au chaud au soleil. Le terrarium doit toutefois être à l'abri des courants d'air. Les pièces où l'on fume ne sont pas adaptées à l'élevage d'animaux.

Aménagement et nettoyage du terrarium : le terrarium est recouvert d'une litière appropriée, z. par exemple un mélange de copeaux de bois dépoussiérés, de foin, de paille et de branches, sur hauteur d'au moins 40 cm. Un bain de sable est également proposé aux gerbilles. Le bain de sable et l'écuelle/la bouteille d'eau sont fixés à la paroi latérale ou placés sur des surfaces surélevées, sinon ils seront enterrés. Des tubes en carton ou en liège, des abris en bois et des branches peuvent être utilisés comme objets d'aménagement. Il faut toutefois être conscient que les gerbilles aménageront elles-mêmes leur "habitation" en creusant des tunnels et des cavités pour leur nid. Les boîtes en carton et les branches placées dans la litière toutefois à maintenir l'ensemble en place.



Terrarium de 120 cm de long avec litière profonde pour creuser un système de construction. Possibilité d'extension de l'espace libre sur le couvercle du terrarium.

plus stable. Du sable humide ou de la terre conviendraient également comme substrat de creusement, mais ils sont extrêmement lourds et sentent plus vite que la litière absorbante de copeaux de bois. Des carreaux de céramique inversés et des pierres sur le fond du terrarium aident à user les griffes.

Attention : les pierres et autres objets d'aménagement lourds doivent posés de manière stable sur le sol de l'enclos avant d'y verser la litière. Dans le cas contraire, les gerbilles de creuser sous la pierre et d'être écrasées. Comme les gerbilles n'émettent que très peu d'urine très concentrée et que leur activité de marquage avec la glande abdominale (au lieu de l'urine) un faible dégagement d'odeurs, le nettoyage du terrarium est très limité. Selon le nombre d'animaux et la taille du terrarium, il n'est généralement nécessaire de remplacer complètement la litière qu'au bout de 2 à 3 mois. Le nettoyage du terrarium est une source de stress importante pour les animaux et ne devrait donc pas trop fréquent. Pour réduire le stress, il est conseillé de déplacer une partie de l'ancien matériau du nid dans le terrarium fraîchement rempli. De nombreuses gerbilles utilisent le bain de sable comme lieu d'excrétion, il faut donc changer le sable régulièrement. En effet, elles ne se baignent que dans du sable frais pour l'entretien de leur pelage.

Exigences légales minimales : Les exigences légales minimales sont définies dans l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) et peuvent être consultées en ligne sur le site de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Il convient de noter que ces données représentent le minimum prescrit par la loi et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un élevage optimal ! Celui qui ne respecte pas les prescriptions légales minimales est punissable. Selon l'annexe 1, chiffre 43 OPAn, un enclos doit une surface minimale de 0,5 m². Les prescriptions d'aménagement prescrivent une litière appropriée pour creuser (au moins 25 cm de profondeur), des possibilités de retraite, un matériau de nid adapté, une nourriture à structure grossière (foin, paille), un mélange de graines, un bain de sable ainsi que des objets en nappe comme du bois tendre et des branches fraîches. L'isolement est interdit.

Alimentation : de l'eau fraîche doit toujours être à disposition. Les mélanges de graines vendus dans le com-

Les aliments pour rongeurs, qui contiennent en partie des protéines animales, doivent compléter chaque jour par de petits morceaux de fruits et de légumes tels que des pommes et des carottes, des graines sauvages fraîches, des graines germées, de l'herbe à chat ou des panicules de foin. Si les gerbilles deviennent trop grosses, faut rationner la nourriture en graines, notamment les graines de tournesol, à une cuillère à café par jour et par animal. Pour occuper les animaux à la recherche de nourriture, il convient de répartir les graines sur la litière, de les enterrer dans du sable sec et propre ou de leur proposer des panicules et des épis entiers dont ils doivent d'abord éplucher les graines. En plein air, les gerbilles aiment manger les graines et les parties vertes des plantes d'absinthe, c'est pourquoi elles semblent également apprécier les salades amères... Malgré l'absence de poches pour les joues, les gerbilles stockent une grande quantité de nourriture dans des mangeoires spéciales dans le système de construction, parfois plusieurs kilos par famille de gerbilles !

Matériel à ronger : pour enrichir le quotidien, faut proposer plusieurs fois par semaine du matériel frais à ronger et à construire. Les branches de noisetier, de hêtre, de bouleau, de saule, d'arbres fruitiers non traités ou de rotin, le foin à longues fibres et le papier ménage non coloré, ainsi que toutes les sortes de carton non imprimé comme les rouleaux de papier toilette et de papier ménage, les boîtes d'œufs et les boîtes en carton sont des exemples de matériaux appropriés. Les mouchoirs en papier ou le papier essuie-tout conviennent comme matériau de nid. Les animaux broient rapidement le matériau, l'utilisent pour construire leur nid ou l'incorporent à la litière. De cette manière, la litière est également plus stable pour la construction d'un système de tunnels.



Les gerbilles sont de véritables bio-déchiqueteuses. Elles broient tout sauf le métal dur et le verre - c'est pourquoi il faut toujours leur suffisamment de branches fraîches et non toxiques, de carton non imprimé et de lingettes cosmétiques ronger.

Santé

Les gerbilles en bonne santé sont actives, curieuses et ont les yeux brillants. Leurs excréments sont constitués de petits haricots solides. Les tumeurs des glandes abdominales relativement fréquentes chez les gerbilles. Il peut s'agir de lipomes, qui peuvent disparaître soudainement, de tumeurs bénignes ou malignes. est important de contrôler régulièrement la glande abdominale. Si un ulcère se développe, un cercle vicieux peut s'installer, car l'animal mord toujours l'ulcère gênant ou l'activité de marquage le blesse et commence à saigner. Il est préférable de montrer les ulcères abdominaux au vétérinaire, qui décidera du traitement nécessaire. Les gerbilles sont également sujettes à l'épilepsie. Les animaux particulièrement timides et non habitués à l'homme peuvent avoir des crises d'épilepsie si on les stresse, par exemple en les attrapant et en les retenant. Cela peut être évité par une habitude soignée (voir manipulation). L'épilepsie se reconnaît à des absences de courte durée ("petit mal"), pendant lesquelles l'animal réagit pas du tout, à des mouvements saccadés ou saccadés du corps ou, dans les cas extrêmes, à de véritables crises d'épilepsie ("grand mal"), au cours desquelles l'animal présente des secousses et des convulsions incontrôlées. La seule chose que l'on puisse faire contre cela : bien rembourrer l'animal pour qu'il ne puisse pas se blesser. Si l'on saisit les gerbilles par le bout de la queue plutôt que par la racine, il se peut qu'elles essaient de se libérer en donnant de violents coups de pied et qu'elles s'épluchent pour ainsi dire de leur propre peau caudale. Il reste alors un résidu sanglant d'os et de muscles. Si cela se produit, il faut emmener d'urgence l'animal chez le vétérinaire. En prévention, toujours tenir l'animal par la base de la queue ou, mieux encore, l'entourer des deux mains sans serrer.

s'accrocher ! Les reins à haute performance de la gerbille, animal des steppes, peuvent être asa-

de l'animal. Si un animal boit beaucoup, urine en grande quantité, que son pelage est terne et terne et que ses flancs s'affaissent au point de ressembler à une tente vue de dos, il faut le vétérinaire. Il n'y a pas de traitement possible en cas d'insuffisance rénale, mais le vétérinaire peut sauver l'animal avant qu'il ne souffre trop.

Manipulation

Les gerbilles ne sont pas des animaux à caresser. Des chercheurs ont découvert qu'elles souffrent énormément de stress lorsqu'elles sont capturées et retenues sans y avoir été habituées au préalable. Les animaux timides peuvent être capturés à l'aide d'un tube en argile qu'ils acceptent comme abri. Avec un peu de patience, il est possible d'appivoiser les gerbilles au point qu'elles acceptent de la nourriture dans la main, voire qu'elles viennent volontairement sur la main. Les graines de tournesol ou de courge sont de bonnes récompenses pour les gerbilles, mais certaines gerbilles aiment aussi les graines de pin.

des graines ou des noix. On peut par exemple choisir les graines de tournesol dans la nourriture en grains et les offrir séparément dans la main. Au début, il faut de la patience : il faut maintenir longtemps la main avec les graines de tournesol dans le terrarium jusqu'à ce qu'une gerbille ose s'approcher des friandises, mais une fois qu'elles ont surmonté leur timidité, elles apprennent à les manger.

rapidement que les mains ne sont pas dangereuses. Certaines gerbilles grimpent même le bras ou l'épaule de leur maître. Il n'est toutefois pas recommandé de laisser les gerbilles s'ébattre librement dans l'appartement. Elles se cachent facilement derrière les meubles et il est difficile de attraper. Pour les animaux, de telles actions sont synonymes de stress et de peur. En revanche, dans un enclos spacieux et aménagé de manière adaptée, les gerbilles présentent un comportement naturel intéressant. L'intérêt de l'élevage de gerbilles réside dans l'observation des animaux, de la manière dont ils interagissent entre eux au sein de leur groupe ou dont ils construisent leur système de construction.

Les enfants et les gerbilles

Lorsque les gerbilles détenues dans des enclos adaptés aux animaux, les enfants peuvent observer comment elles jouent entre elles ou comment l'une d'entre elles se détend et se sur le côté pour qu'un autre membre de la famille puisse lui nettoyer la fourrure. Les animaux apprivoisés prennent les graines de tournesol dans leur main et les décortiquent à l'aide de leurs pattes avant habiles et de leurs dents de rongeurs. Les gerbilles offrent donc avant tout de nombreuses possibilités d'observation, mais ne sont pas des animaux à câliner. Les enfants peuvent toutefois imaginer sans cesse de nouvelles possibilités d'occupation pour les animaux : par exemple une "boîte de jeu". Par un couloir (latte en bois complétée par un grillage former un tunnel sûr), les animaux peuvent sortir du terrarium ouvert et grimper seuls, mais sous la surveillance de l'enfant, dans une grande boîte en carton remplie soit de morceaux de papier provenant de la déchiqueteuse, soit de papier de soie froissé, soit de chips de polystyrène dans lesquelles on a caché des graines de tournesol. Les gerbilles, curieuses et gourmandes, se défouler dans une telle boîte de jeu et fouiller pour trouver les récompenses alimentaires tant convoitées.

Pour tout élevage d'animaux, les enfants doivent impérativement être guidés et surveillés par des adultes.



tournesol, les gerbilles curieuses s'appivoisent généralement rapidement. Il existe différentes variantes de couleurs. Ici, de gauche à droite : Pied Agouti (couleur sauvage, tacheté de blanc), Agouti (couleur sauvage) et Grey Agouti (gris sauvage).

être en mesure de le faire. Ils doivent apprendre à être prévenants avec les animaux qui leur sont confiés et à respecter leurs besoins. Malheureusement, il arrive souvent que les animaux soient effrayés sans que l'on s'en aperçoive et sans que cela soit intentionnel, ou que les enfants leur infligent des douleurs.

Vacances

Les animaux ne doivent être achetés que lorsque la question de la prise en charge pendant les vacances réglée. Comme les grands terrariums de gerbilles sont difficilement transportables, une prise en charge sur place est idéale. L'investissement n'est pas très , puisqu'il suffit de donner de la nourriture et de l'eau et de contrôler les animaux.

Acquisition

Achat : les gerbilles peuvent être achetées dans les refuges pour animaux ou dans les bonnes animaleries. Il est également fréquent que des jeunes animaux soient donnés par des connaissances. Attention aux achats sur Internet : il faut absolument pouvoir voir les animaux chez le propriétaire / l'éleveur avant de les acheter, afin de pouvoir s'informer sur les conditions de détention et d'élevage. est important que les jeunes animaux aient grandi dans un terrarium avec une litière profonde dans le terrier parental (afin qu'ils ne développent pas un comportement de creusage stéréotypé) et qu'ils n'aient pas été séparés trop tôt de leurs parents (afin qu'ils ne développent pas un comportement de grillage).

Elevage : les gerbilles sont sexuellement matures à 10 - 12 semaines. Les femelles mettent au monde 4 à 5 petits par portée, parfois jusqu'à 10. Un couple de gerbilles peut élever jusqu'à dix portées par an. Tant que les fils et les filles adultes et sexuellement matures restent avec leurs parents, seuls les parents se reproduisent (en général). Mais s'ils sont séparés de leurs parents à l'âge de 7 à 8 semaines, ils doivent être détenus en groupes de même sexe, les groupes de femelles et de mâles vivant très pacifiquement ensemble. Comme les gerbilles se reproduisent rapidement et qu'il est difficile de trouver de bonnes places pour la progéniture, l'élevage est déconseillé ! Il est déconseillé de castrer ou de vasectomiser le mâle d'un couple.

Attention : si les jeunes gerbilles sont séparées trop tôt de leurs parents, ou avant le prochain

Les enfants nés de la première portée de frères et sœurs plus jeunes développent un trouble du comportement appelé "gitternage".



Des gerbilles de différentes couleurs au nid. Les jeunes gerbilles aveugles, sourdes et impuissantes et sont allaitées pendant 3 à 4 semaines.

Autres espèces : d'autres espèces de gerbilles sont parfois proposées dans les animaleries, exemple la gerbille de midi (*Meriones meridianus*) et la gerbille à queue grasse / duprasi (*Pachy- uromys duprasi*) du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi que la gerbille de Perse (*Meriones persicus*). Alors que les exigences de la gerbille de midi et de la gerbille de Duprasi sont similaires à celles de la gerbille de Mongolie, la gerbille de Perse, plus grande et agile, a besoin de beaucoup plus d'espace ; en outre, elle grimpe et saute facilement, contrairement à la gerbille de Mongolie. Les gerbilles de Perse doivent être maintenues dans de très grands terrariums (100 x 200 x 180 cm) avec une couche de terre profonde (60 - 80 cm) et de nombreuses possibilités de grimper en hauteur, comme les degus. En tant que Des racines, des branches, des planches ou des tas de pierres solidement fixés constituent des possibilités d'escalade.

Plus d'informations Liens

- Bases légales : www.blv.admin.ch> Animaux> Bases légales et d'exécution> Législation> Législation dans le domaine de la protection des animaux> Protection des animaux> Ordonnance sur la protection des animaux
- Placement d'animaux de refuge : www.adopt-a-pet.ch
- Enclos : www.kleintiertraum.ch, www.kleintierstaele.ch
- Liste des vétérinaires pour animaux exotiques www.tierschutz.com/heimtiere/tierarztliste/index.html

Littérature

- Brigitte Rauth-Widmann (1999). Rats, souris et gerbilles comme animaux de compagnie. Maison d'édition Oertel & Spörer Munich.
- Eva Waiblinger (2010). The laboratory gerbil. p. 327 - 347. In : The Care and Management of Laboratory and Other Research Animals, Eds. R. Hubrecht & J. Kirkwood. Wiley-Blackwell.

Photos

Dr. Eva Waiblinger (sauf indication contraire)

Éditeur

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018
Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3,
sts@tierschutz.com, www.tierschutz.com

Cette fiche et d'autres peuvent être téléchargées sur www.tierschutz.com> Publications> Animaux de compagnie.